

Let op vitaliteit!

antispruitbehandeling



Zaaiuien

Hybing

Vroegste Rijnsburger in Nederland

Summit

Keiharde ui

Hyfort

IJzersterke bewaarui

Hypark (BGS 235)

Mooie ronde en sterk bollende ui

Hytech

Hoge opbrengst met sterke huid

Hyline

Ronde, harde en uniforme ui

Hyskin

Betrouwbaar en zeker

Hybelle

Harde ui met goede huidvastheid

Hyfield

Een productieve top-ui

Redspark

Groeikrachtige en productieve rode ui

Red Baron

Meest geteelde rode uienras in Nederland

www.degrootenslot.nl

voor het laatste nieuws op het gebied van o.a. uienteelt.



PARTNERS IN ALLIUMVEREDELING

De Groot en Slot Allium B.V.

Bogert 3 • 1721 PH Broek op Langedijk • Nederland

Postbus 28 • 1720 AA Broek op Langedijk • Nederland

Tel. 0226 331200 • Fax 0226 331212 • E-mail: info@degrootenslot.nl • Website: www.degrootenslot.nl

De Groot en Slot, kwaliteit staat voorop


Antispruitbehandeling 2007

Tips voor een goed resultaat!

Behaal een zo hoog mogelijke opbrengst met behoud van kwaliteit.

Tips voor een goed resultaat:

- Houd uw gewas vitaal en gezond, dus vrij van trips en schimmel-aantastingen, eventueel bladvoeding meegeven. Na de MH bespuiting moet de sapstroom nog twee weken volledig zijn. De MH heeft deze twee weken nodig om door heel de bol opgenomen te worden.
- De bespuiting uitvoeren als de boldikte op de breedste lijn, minstens 3x de schachtdikte is (zie foto rechts). De celdeling in het groeipunt van de bol is dan van nature gestopt, terwijl de celstrekking (verdikking) nog gewoon verder gaat. Tweede controle: Als er zijwaarts tegen het blad wordt geduwd, veert het niet meer terug. Een te vroege bespuiting kan losse groei van de rokken veroorzaken.
- Stel de MH-bespuiting in een sterk heterogeen gewas zo lang mogelijk uit. De minder aanwezige grote uien krijgen een dikkere nek en zullen langer overeind blijven staan. De kleinere uien krijgen dan meer kans om aan de norm 3x de schachtdikte te voldoen.



- Zorg voor een egale bevochtiging van het blad. Gebruik naast de uitvloeier voldoende water en een niet te grove druppel. Voer de bespuiting uit bij droog weer. De temperatuur in het gewas mag niet boven de 20°C zijn. Beste tijdstip van spuiten is in de avond, of eventueel direct in de morgen nadat het gewas is opgedroogd. Voor een goed effect moet het gewas na de bespuiting minimaal tien uur droog blijven.
- De praktijk heeft uitgewezen dat MH ook invloed heeft op oogstzekerheid en huidkwaliteit. Wanneer door slechte weersomstandigheden de oogst wordt verlaat, voorkomt MH tevens hergroei van de wortelkrans.

Veel succes en een goede oogst toegewenst.



PARTNERS IN ALLIUMVEREDELING

Noord Nederland

Gerard Buizer

mobiel: 06 53 164 877

e-mail: g.buizer@degrootenslot.nl

West Nederland

Joost Snoek

mobiel: 06 10 858 908

e-mail: j.snoek@degrootenslot.nl

Zuid Nederland / België

Wim Menu

mobiel: 06 22 378 492

e-mail: w.menu@degrootenslot.nl

De Groot en Slot, kwaliteit staat voorop