

Antispruitbehandeling Info



www.degrootenslot.nl

voor het laatste nieuws op
het gebied van uienteelt.

Zaaiuien

Hybing

Vroegste Rijnsburger in Nederland

Summit

Keiharde ui

Hyfort

IJzersterke bewaarui

Hypark

Mooie ronde en sterk bollende ui

Hytech

Hoge opbrengst met sterke huid

Hyline

Ronde, harde en uniforme ui

Hyskin

Betrouwbaar en zeker

Hybelle

Productief en zeer huidvast

Hyfield

Een productieve top-ui

Hystar

Robuuste ui met goede opbrengst

Redspark


Rood, groeiachtig en uniform

Red Baron

Meest geteelde rode uienras in
Nederland

De Groot en Slot, kwaliteit staat voorop

Antispruitbehandeling Info



Tips voor een goed resultaat:

- Houd uw gewas tijdens de groei vitaal en gezond, en vrij van trips en schimmelaantastingen om in de afrijpingsfase voldoende sapstroom te houden. Het antispruitmiddel heeft twee weken nodig om volledig door de bol opgenomen te worden.
- De bespuiting uitvoeren als de nek/bol-verhouding **minstens 1:3** is (zie kader rechts). Heterogene stand is moeilijk te beoordelen.
- Gebruik naast de uitvloeier voldoende water (300-500l/per ha) en een fijne druppel voor een egale bevochtiging.
- Beste tijdstip van spuiten is 's avonds, of eventueel 's ochtends nadat het gewas is opgedroogd en geen felle zonneschijn of regen wordt verwacht.
- Voor een goed effect moet het gewas na de bespuiting minimaal tien uur droog blijven. Bij 's avonds laat spuiten, nog extra droogtijd in de morgen bijtellen, omdat het gewas 's nachts niet droogt.
- De temperatuur in het gewas mag niet boven de 20°C zijn.
- Tijdens de afrijpingsfase wordt het plant-

hormoon Abscinezuur (ABA) aangemaakt, die verantwoordelijk is voor de natuurlijke spruitrust van de ui. Antispruitbehandeling versterkt de werking van dit planthormoon. Beregenen of veel hemelwater in de afrijpingsfase geeft een verminderde werking van dit planthormoon en dus ook op de spruitrust en bewaarbaarheid.

- Een te vroege bespuiting kan losse groei van de rokken veroorzaken, waardoor de ui hol en zachter wordt (voosheid). Bij een goed uitgevoerde bespuiting, is in de bewaring bij een dwarsdoorsnee een minime ruimte rondom de 'kernpit' waar te nemen.
- Controle spruitrust in de bewaring: druk 20 uien (Ø 45/60 mm) in november/december, op vochtige potgrond en zet deze op een warme vloer. Bij wortelgroei binnen één week is de spruitrust onvoldoende. Als er binnen twee weken geen wortelgroei ontwikkelt, zijn de uien in goede spruitrust.
- Uien in de koelcel, droog en op een constante bewaar temperatuur van 7°C helpt de uien rustig te houden.

Meten is weten!

Met behulp van de bijgeleverde schuifmaat kunt u meten hoe de nek/bol-verhouding zich ontwikkeld.

Meet eerst de halsdikte, vermenigvuldig dit met 3. Dit moet de minimale boldikte zijn. De celdeling in het groeipunt van de bol is dan van nature gestopt, terwijl de celstrekking (verdikking) nog gewoon verder gaat.

Door in de 2^e, 3^e en 4^e week in juli te gaan meten met uw schuifmaat, komt u niet voor verrassingen te staan. Het kan zijn dat de nek/bol-verhouding aan de normering van 1:3 voldoet, zodat u tot spuiten kunt overgaan ook al vertoont uw gewas nog geen neiging tot strijken.

Een succesvolle antispruitbehandeling toegewenst!

De Groot en Slot, kwaliteit staat voorop

Noord Nederland
Gerard Buizer
mobiel: (+31)(0)6 53 164 877
e-mail: g.buizer@degrootenslot.nl

Midden Nederland
Joost Snoek
mobiel: (+31)(0)6 10 858 908
e-mail: j.snoek@degrootenslot.nl

Zuid Nederland / België
Wim Menu
mobiel: (+31)(0)6 22 378 492
e-mail: w.menu@degrootenslot.nl