

Amistar zorgt voor kwaliteitsverbetering én opbrengstverhoging van uw uien.




Door de lange en sterke preventieve werking worden uw uien het héle seizoen beschermt tegen diverse schimmelziekten (o.a. Botrytis, Stemphylium én valse meeldauw).

Amistar[®] toevoegen aan het spuitschema verbetert de kwaliteit én opbrengst van uw uien. Dit is in 2007 aangetoond en wordt in 2008 nog eens bevestigd. Op 17 bedrijven werden in samenwerking met Wiskerke Onions en UIKC (Uien Innovatie en Kennis Centrum) kwaliteitsproeven uitgevoerd.


Na bewaring werden de verschillende partijen beoordeeld. De resultaten van de praktijkproeven 2006/2007 ziet u in de onderstaande grafiek.

Resultaat 9 praktijkproeven, beoordeeld in maart 2007




In 2007 zijn er opnieuw 8 praktijkproeven, verspreid over Nederland uitgevoerd. Naast de kwaliteit is ook de opbrengst onderzocht. De partijen zijn beoordeeld door onafhankelijke uienexperts (zaadhuizen, verwerkers, inkopers).

Resultaat 8 praktijkproeven, beoordeeld in april 2008



Resultaat 8 praktijkproeven, beoordeeld in april 2008



Uit de onderstaande sortering kan geconcludeerd worden dat de uien op de 8 onderzochte percelen dankzij de toevoeging van Amistar een **hogere** en een **grovere** opbrengst hebben.

Sortering	< 40 mm	40-50 mm	50-60 mm	> 60 mm	Totaal
Amistar vrij schema (ton/ha)	3.0	10.0	22.0	33.0	68.0
Amistar schema (ton/ha)	3.0	11.0	23.0	37.0	74.0

Conclusie:

Amistar toevoegen aan het spuitschema verbetert de kwaliteit, kleur, grofheid én opbrengst!

Het advies:

- Spuit zodra Botrytis- en/of Stemphyliumdruk toeneemt
- Dosering: 0,8-1 ltr/ha
- In tankmix met mancozeb
- Maximaal 4x per seizoen
- Toepassen in afwisselschema (vanuit resistentie oogpunt)
- Veiligheidstermijn: 2 weken

